

	성분명	Succimer 2,3-Dimercaptosuccinicacid (DMSA)		제조회사	laboratories SERB	
	제품명	Succicaptal		용량	200 mg/cap	
사용법	급성 납, 비소, 수은 중독					
	1. Initial dose (max 1.8 g/d) Succimer 10 mg/kg <u>PO q8hr for 5 days</u>					
	2. Maintenance Succimer 10 mg/kg <u>PO q12hr for 2 weeks</u>					
	3. 소아 체중별 용량					
	체중(kg)	8-15	16-23	27-34	35-44	>45
	일회용량(mg)	100	200	300	400	500
주의사항	<ul style="list-style-type: none"> · 갈락토스혈증, 포도당 또는 갈락토스 흡수장애 증후군, 젖당분해효소 결핍 시금기(succimer에 젖당 포함) · 소아에서 체중(kg) 기준으로 계산하면 상대적으로 적은 양이 투여되므로, 350 mg/m² BSA 로 계산하거나 표를 이용함 					
적응증	급성 중독 ; 납, 비소, 수은					
부작용	과민반응, 위장관 자극 증상(구역, 구토, 설사), 일시적인 간기능 이상, 발적					
금기	과민반응의 병력, 지속적으로 중금속에 노출되고 있는 환자					
고려사항	소아	신기능장애	간기능장애	임신정보		
	350 mg/m ² BSA	주의	영향 없음	Category C		

본 설명서는 약품의 기본정보에 전문가의 자문을 받아 작성된 것이나, 정보를 이용한 환자 치료에 대한 모든 책임은 직접 진료하는 의료진에게 있습니다.