

	성분명	Hydroxocobalamin		제조회사	MERIDIAN
	제품명	Cyanokit		용량	5 g/vial
사용법	급성 시안화물(Cyanide) 중독				
	1. Initial dose Hydroxocobalamin 5 g + NS 200 mL mix IV over 15 min 2. Second dose (total max 10 g) Hydroxocobalamin 5 g + NS 200 mL mix IV over 15-120 min (임상판단으로 투여 속도조절) *주사제 제조: NS 200 mL 을 포장에 포함된 transfer spike를 이용하여 vial에 주입 후 약 60초 이상 상하좌우로 가볍게 돌려 용해(흔들지 말 것)				
주의사항	<ul style="list-style-type: none"> · 제조 시 NS 없을 경우 D5W, LR 사용 가능 · 제조 후 검붉은 색이 아니거나 입자가 떠다니는 것이 보일 경우에는 폐기 · 다른 시안화물 antidote, 혈액제제 등과 사용 시 다른 정맥라인을 사용 · 25 °C (15-30)에서 보관하며 한번 제조 후 6시간까지 사용가능 · 적색을 띠어 혈액투석 시 투석에 의한 부작용과 오인될 수 있음에 주의 				
적응증	시안화물(Cyanide) 가스흡입, 경구, 또는 피부 노출 중독 의심, 또는 중독(화재, 테러 등 가스 흡입, sodium nitroprusside 치료 등에서 발생)				
부작용	<ul style="list-style-type: none"> · 일시적인 적뇨증, 홍반, 발진, 오심, 구토, 림프구를 감소 · 과민성쇼크, 혈관부종, 부종, 호흡곤란, 발진 등 알레르기 반응 · 혈압상승(4 시간이내) · 광과민성으로 인한 홍반, 햇빛 피할 것 				
금기	자료 없음				
고려사항	소아	신기능장애	간기능장애	임신정보	
	효과 안전성 미검증 (70 mg/kg 용량 고려)	임상자료 없음	임상자료 없음	Category C	

본 설명서는 약품의 기본정보에 전문가의 자문을 받아 작성된 것이나, 정보를 이용한 환자 치료에 대한 모든 책임은 직접 진료하는 의료진에게 있습니다.