

	성분명	Digoxin-specific antibody fragments		제조회사	BTG international Inc.
	제품명	DigiFab®		용량	40 mg/vial
사용법	급성 Digoxin, cardiac glycosides 중독				
	<p>1. 급성 중증 경구섭취량 확인불가 (total 20 vials)</p> <p>1) Initial dose DigiFab 10 vial (DW 40 mL) + NS 50 mL mix <u>IV over 15~30min</u></p> <p>2) Second dose DigiFab 10 vial (DW 40 mL) + NS 50 mL mix <u>IV over 30min</u></p> <p>2. 급성 음독량 확인 시, 섭취량 기준 vials 계산 DigiFab dose (vials) = [digoxin 섭취량(mg) x 0.8] / 0.5</p> <p>* 조제: DW 4 mL 를 vial 에 주입하여 녹인 후 NS 50 mL 에 추가 희석 후 IV</p>				
주의사항	<ul style="list-style-type: none"> · 투여 30분 이내에 증상 호전되며, 제거반감기 15 ~ 20시간 · 투여 동안 심전도, 활력징후, 저칼륨혈증 발생 주의 · 필요 시 약물 투여 전 피내/결막 알러지 검사 시행 · 투여효과는 디곡신 혈청농도가 아닌 독성 증상의 호전을 통해 평가 · 약물 투여 후 14일까지 부작용 발생할 수 있음 				
적응증	<ul style="list-style-type: none"> · 치명적 cardiac glycosides 혹은 digoxin 중독(심한 심실부정맥, 악화되는 서맥, atropine 반응하지 않는 2도 혹은 3도 방실차단, 혈청칼륨 > 5.5 mEq/L) · 급성 digoxin 과다복용 (복용량 ≥ 10 mg 성인, ≥ 4 mg (0.1 mg/kg) 소아)로 혈청 농도 ≥ 10 ng/mL 				
부작용	심부전 악화(저혈압, 호흡 곤란, 서맥 등), 저칼륨혈증, 혈소판감소증, 건조열, 혈청병, 두통, 오심, 구토, 피곤함, 오한, 약물 투여부위 자극이나 통증, 급성 알러지 반응(발적, 안면홍조, 안면부종, 천명음 등), 가성(false) 디곡신 혈청농도 증가				
금기	알러지 과거력: Digoxin-specific Fab fragments 포함약물, papain, chymopapain, or other papaya 추출물, mannitol, sodium acetate, sheep immunoglobulin				
고려사항	소아	신기능장애	간기능장애	임신정보	
	급성 성인과 동일	신장배설 주의	영향 없음	Category C	

본 설명서는 약품의 기본정보에 전문가의 자문을 받아 작성된 것이나, 정보를 이용한 환자 치료에 대한 모든 책임은 직접 진료하는 의료진에게 있습니다.