

	성분명	Benzylpenicillin (Penicillin G)	제조회사	Laboratorios Normon
	제품명	Penibiot	용량	500만 IU/ vial

사용법	Amatoxin 중독 시 정맥투여			
	<p>① Continuous dose <u>Benzylpenicillin 3000만 IU (6 vials) + 0.9% NaCl 1000 mL mix IV 45 mL/hr</u> (30만 – 100만 IU/kg/day, over 24 hrs)</p> <p>* 하루 수분보충량(2-3 L)에 mix 하여 지속투여 가능</p>			
주의사항	<p>① 경련 발생할 위험 있으므로 환자감시 필요 ② 세팔로스포린계열의 항생제에 알레르기 있는 경우 주의해서 사용 ③ 다른 약물과도 알레르기가 잘 생기는 경우는 과민반응에 주의 ④ 천식, 신부전, 심부전 과거력의 환자에서 사용 주의</p>			
적응증	Amatoxin 추정 또는 확인된 중독			
부작용	<p>① 혈액학: 백혈구 감소증, 호중구 감소증 발생 가능 ② 과민증: 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명, 기관지경련</p>			
금기	페니실린 알레르기			
고려사항	소아	신기능장애	간기능장애	임신정보
	체중 고려	배설 저하	배설 저하	Category B

본 설명서는 약품의 기본정보에 전문가의 자문을 받아 작성된 것이나, 정보를 이용한 환자치료에 대한 모든 책임은 직접 진료하는 의료진에게 있습니다.