

	성분명	Box Jellyfish antivenom	제조회사	Seqirus Pty, Australia
	제품명	Box Jellyfish antivenom	용량	20,000 units/ 1.5-4 mL/ vial
사용법	성인 정맥투여			
	<b>① Initial dose</b> <b>Antivenom 20,000 units + 0.9% NaCl 40 mL mix IV 60 mL/hr</b> <b>(over 40 mins)</b>			
	<b>② Repeated dose (total max 60,000 units)</b> <b>증상 호전없으면 2-4시간 간격 2회 추가</b> <b>Antivenom 20,000 units + 0.9% saline 40 mL mix IV 60 mL/hr</b> <b>(over 40 mins)</b>			
	* fluid overloading 우려 시 0.9% NaCl 20 mL mix (5배 정질액에 희석)			
	Box Jellyfish 노출 후 심정지 발생 시			
주의사항	<b>① Initial, repeated dose (total max 60,000 units)</b> <b>Antivenom 20,000 units + 0.9% NaCl 20 mL mix IV over 2-5 mins</b> 반응을 관찰하며 2번 추가투여			
	<b>성인 근육투여(정맥투여 불가능 시)</b> <b>① 3 vials 근육투여</b> <b>Antivenom 60,000 units IM (허벅지 바깥 쪽 다른 부위에 근주)</b>			
적응증	<b>① Box Jellyfish 독에 노출되어 아래 중 한 가지를 보일 때</b> a 현재 심정지 b 의식상태 감소 c 심/폐기능 감소 또는 부전 d 독에 의한 손상 면적이 팔/다리 중 절반을 넘는 경우 e 응급처치 및 약물 복용에도 통증이 지속되는 경우			
	<b>부작용</b> ① 소화기: 구역, 구토, 식욕부진, 설사 ② 과민증: 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명, 기관지경련 ③ 순환기: 드물게 빈맥, 고혈압 ④ Delayed serum sickness			
금기	급성 아나필락시스 과거력			
고려사항	소아	신기능장애	간기능장애	임신정보
	동일	정보 없음	정보 없음	정보 없음

본 설명서는 약품의 기본정보에 전문가의 자문을 받아 작성된 것이나, 정보를 이용한 환자치료에 대한 모든 책임은 직접 진료하는 의료진에게 있습니다.