

	성분명	2.5% calcium gluconate gel		제조회사	Calgonate corp.
	제품명	Calgonate gel		용량	25 g/ tube
사용법	불화수소산 노출 피부도포				
	① 노출된 피부 5분 이상 시원한 물로 남아있는 불화수소산을 제거 ② Calgonate 젤을 노출된 피부에 도포하고 흡수되도록 마사지 ③ 전문적 의료처치가 이루어질 때까지 15분마다 다시 도포하고 마사지  * 모든 불화수소산(hydrofluoric acid) 노출은 세척 후 병원으로 이송해야만 하며, calcium gluconate gel 는 응급처치에 해당함				
	손톱 밑까지 침투한 경우				
주의사항	① Calgonate 젤을 손톱 위와 주변으로 충분히 도포하고 15분 마사지				
	① 2차 노출 예방법, 구조자에게 피해 발생 방지에 주의 a) 가능하면, 노출환자가 스스로 세척과 젤 도포를 해야 함 b) 보조가 필요한 경우에는, 보조자는 반드시 글러브(neoprene)를 포함한 적절한 보호장비를 착용해야만 함 c) 사용 후 용기와 남은 젤은 안전하게 폐기 ② 튜브에서 직접 짜서 사용하고, 재사용하지 않고 남은 젤은 폐기 ③ 항상 환기가 잘 되는 곳에서 사용				
적응증	불화수소산(hydrofluoric acid) 피부노출에서 통증, 조직 화상, 뼈 손상을 감소시키거나 예방하기 위해 사용				
부작용	피부 발적				
금기	외용제로만 사용				
고려사항	소아	신기능장애	간기능장애	임신정보	
	사용 가능	칼슘농도 확인	사용 가능	정보 없음	

본 설명서는 약품의 기본정보에 전문가의 자문을 받아 작성된 것이나, 정보를 이용한 환자치료에 대한 모든 책임은 직접 진료하는 의료진에게 있습니다.