


| | | | | | |
|---|--|---|--------|------------|--------------|
|  | 성분명 | Dantrolene sodium, mannitol, sodium hydroxide | | 제조회사 | US WorldMeds |
| | 제품명 | Revonto | | 용량 | 20 mg/ vial |
| 사용법 | 악성고열증 | | | | |
| | <p>① Initial dose</p> <p><u>Dantrolene 60 mg + DW(증류수) 180 mL mix rapid IV push</u> (1 mg/kg)</p> <p>혹은</p> <p><u>Dantrolene 60 mg + DW(증류수) 180 mL mix IV 3 ml/kg/min</u></p> <p>② Repeated dose (total max 10 mg/kg, 일반적 2-3 mg/kg)</p> <p>15분마다 동일용량 투여 <u>증상 호전될 때까지(발열, 근경축, 빈맥)</u></p> <p><u>Dantrolene 60 mg + DW(증류수) 180 mL mix rapid IV push</u></p> <p>혹은</p> <p><u>Dantrolene 60 mg + DW(증류수) 180 mL mix IV 3 ml/kg/min</u></p> <p>③ Maintain dose</p> <p><u>Dantrolene 1-2 mg/kg rapid IV over 3-4 hrs</u></p> <p>경구투여로 가능한 빠르게 전환(6시간 이내 효과적)</p> <p>Dantrolene capsule 1-2 mg/kg/day IV q 6 hrs for 1-3 days</p> | | | | |
| 주의사항 | <p>① 조제 시 증류수 60ml 를 넣고 약 20초 동안 흔들여 사용 (주의, D5W, 0.9% NaCl 등은 사용하면 안됨. 산염기 문제)</p> <p>② 제조 후 플라스틱용기에 넣어 차광하여 투여(유리용기 금기)</p> <p>③ Vial 은 차광해야 하며 제조 후 6시간 내 사용되어야 함</p> <p>④ Vial 에는 20 mg dantrolene sodium, 3000 mg mannitol, sodium hydroxide</p> <p>⑤ 혈관 누출이 발생하지 않도록 주의</p> | | | | |
| 적응증 | 악성 고열증 (malignant hyperthermia, 증상: 빈맥, 빈호흡, 중심정맥 저산소화, 고탄산혈증, 대사성 산증, 골격근 강직, 청색증 및 피부 얼룩형성, 발열 등) | | | | |
| 부작용 | <p>① 상/하지 근력약화, 나른함, 어지러움</p> <p>② 폐부종, 혈전정맥염, 누출에 의한 조직괴사</p> <p>③ 두드러기, 발적, 아나필락시스</p> <p>④ 주사부위의 통증, 발적, 부종</p> <p>⑤ 간염, 경련, 폐부종, 심막염</p> | | | | |
| 금기 | 없음 | | | | |
| 고려사항 | 소아 | 신기능장애 | 간기능장애 | 임신정보 | |
| | 성인 동일 | 사용 가능 | 간독성 가능 | Category C | |

본 설명서는 약품의 기본정보에 전문가의 자문을 받아 작성된 것이나, 정보를 이용한 환자치료에 대한 모든 책임은 직접 진료하는 의료진에게 있습니다.